



PRIMELE REZULTATE

COORDINATION GROUP



STUDY GROUP



APPROVED BY



SUPPORTED BY





CE ESTE PREP?

PrEP (profilaxia pre-expunere) denumește utilizarea unui medicament antiretroviral HIV de către o persoană HIV-negativă, cu scopul de a preveni infectarea cu acest virus. Truvada® este principalul medicament folosit ca PrEP. Până în octombrie 2016, Franța era singura țară europeană în care PrEP putea fi prescrisă de medici și acoperită de asigurarea de sănătate.

PrEP nu oferă protecție contra altor infecții sexual transmisibile (IST-uri).

PrEP nu trebuie confundată cu PEP (profilaxia post-expunere, sau „tratamentul de urgență”): aceasta este o combinație de medicamente antiretrovirale care se iau pentru a preveni infectarea cu HIV după expunerea la virus.

CARE AU FOST OBIECTIVELE CERCETĂRII ONLINE FLASH! PREP IN EUROPE?

Obiectivul acestei cercetări a fost o mai bună înțelegere a nivelului de cunoștințe despre PrEP, a atitudinilor față de acest tratament, a dorinței persoanelor de a o utiliza și a utilizării ei în Europa, pentru ca, mai apoi, aceste informații să fie utilizate în politicile de sănătate sexuală.

Cercetarea Flash! PrEP in Europe s-a desfășurat online, simultan în 12 țări europene, între 15 iunie și 15 iulie 2016. Acest document prezintă primele rezultate la nivel european.

Majoritatea respondenților au fost recrutați prin anunțuri postate pe aplicații/site-uri de dating, Facebook® și Twitter®, pe paginile ONG-urilor implicate în proiect, pe site-urile web frecventate de persoane LGBTI și prin distribuirea de materiale informative în cadrul altor activități.

DE UNDE AU VENIT RESPONDENȚII?

În total, au răspuns la chestionar

15880 de persoane!


Le mulțumim tuturor:
fără ei, cercetarea nu ar fi putut avea loc.

205


Otros países europeos

91

Otros países



DISTRIBUȚIA RESPONDENȚILOR ÎN FUNCȚIE DE GEN



Din cauza distribuției inegale a eșantionului, rezultatele următoarelor subpopulații sunt prezentate separat: bărbați care trăiesc în Germania, bărbați care trăiesc în alte țări, femei și transgenderi.

Din cauza unor probleme de traducere, eșantionul din România nu este inclus în această prezentare și va fi analizat separat.




Bărbații din Germania au fost recrutați în special prin aplicațiile de dating gay/MSM și prin site-ul web Planet Romeo®.




1 CINE A RĂSPUNS LA CHESTIONAR?

← Jumătate dintre ei aveau maxim **37 de ani.**

STATUS RELAȚIONAL



SITUAȚIE FINANCIARĂ



ACTIVITATEA SEXUALĂ DIN ULTIMELE 6 LUNI

SEX CU

NICIUN PARTENER
SEXUAL

21%

2179

♂
67%

6919



2%

177



<1%

6



7%

763



<1%

75



<1%

27



1%

136



2 CUNOȘTIȚE ȘI ATITUDINI DESPRE PREP

37%

au afirmat că știau ce este PrEP încă dinainte să participe la cercetare.

Dintre aceștia, circa

80%

aveau informații corecte despre PrEP. În rândul respondenților care dețineau informații greșite, cel mai frecvent întâlnită a fost confuzia dintre PEP și PrEP.

44%

erau interesați să utilizeze PrEP. Principalele motive

- „M-aș simți mai în siguranță”
- și
- „Aș fi mai puțin îngrijorat”

Principalele motive ale celor care NU erau interesați

- „Sunt îngrijorat de efectele secundare”
- și
- „Nu vreau să iau medicamente în fiecare zi”

44%

au fost de părere că PrEP le va acoperi nevoile în materie de prevenire.

3 PREFERINȚE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CONDIȚIILE DE DISTRIBUIRE

Aproape

80%

au afirmat că PrEP trebuie să fie distribuită ca parte dintr-un pachet complex de prevenire (testare regulată pentru HIV și IST-uri, tratament, sprijin din partea altor persoane peer etc.).

- Cabinetele medicilor generalişti
- și
- Centrele de sănătate comunitare

au fost considerate cele mai potrivite locuri pentru distribuirea PrEP pe viitor.

40%

dintre respondenți ar dori ca PrEP să fie gratuită pentru cei care au nevoie de ea

iar

41%

au afirmat că PrEP trebuie să fie acoperită măcar parțial de asigurarea de sănătate.

4 UTILIZARE INFORMALĂ

Dintre respondenții care știau ce este PrEP dinainte de completarea chestionarului, doar maxim

4%

(n=147)

luau deja PrEP în afara unui cadru formal.

Aceștia își obțineau pastilele PrEP în general

- cu rețetă de la medic (utilizare off label),
- utilizând tablete PEP pe post de PrEP
- sau
- de la un prieten HIV-positiv care le dădea pastilele lui

Cu toate acestea, mai mult de


70%

% dintre acești „utilizatori de PrEP informal” au declarat că iau acest tratament fără să fie monitorizați de medic sau cu o monitorizare medicală neregulată.




Bărbații din alte țări au fost mai bine conectați la asociațiile active în domeniul prevenirii HIV.


1 CINE A RĂSPUNS LA CHESTIONAR?



STATUS RELAȚIONAL



SITUAȚIE FINANCIARĂ



ACTIVITATEA SEXUALĂ DIN ULTIMELE 6 LUNI

SEX CU

NICIUN PARTENER
SEXUAL

17%

706

76%

3206



3%

121



<1%

3



3%

112



<1%

30



<1%

2



<1%

17

2 CUNOȘTINȚE ȘI ATITUDINI DESPRE PREP

77% au afirmat că știau ce este PrEP încă dinainte să participe la cercetare.

Dintre aceștia, circa **80%** aveau informații corecte despre PrEP. În rândul respondenților care dețineau informații greșite, cel mai frecvent întâlnită a fost confuzia dintre PEP și PrEP.

54% erau interesați să utilizeze PrEP. Principalele motive:

- „M-aș simți mai în siguranță”
- și
- „Aș fi mai puțin îngrijorat”

Principalele motive ale celor care NU erau interesați:

- „Nu am nevoie să schimb modul în care mă protejez”
- și
- „Nu vreau să iau medicamente în fiecare zi”

57% au fost de părere că PrEP le va acoperi nevoile în materie de prevenire.

3 PREFERINȚE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CONDIȚIILE DE DISTRIBUIRE

85% au fost de părere că PrEP trebuie să fie distribuită ca parte dintr-un pachet complex de prevenire (testare regulată pentru HIV și IST-uri, tratament, sprijin din partea altor persoane peer etc.).

- Centrele de sănătate comunitare
- și
- Cabinetele medicilor generaliști

au fost considerate cele mai potrivite locuri pentru distribuirea PrEP pe viitor.

51% dintre respondenți ar dori ca PrEP să fie gratuită pentru cei care au nevoie de ea iar **38%** au răspuns că ar trebui să fie acoperită cel puțin parțial de asigurarea de sănătate.

4 UTILIZARE INFORMALĂ

Dintre respondenții care știau ce este PrEP dinainte de completarea chestionarului,

5% (n=156) luau deja PrEP în afara unui cadru formal.

Ei își obțineau pastilele PrEP în general


- cumpărându-le online
- utilizând tablete PEP pe post de PrEP,
- sau
- cu ajutorul rețetelor de la medici (utilizare off label).

Cu toate acestea, **2/3** dintre acești „utilizatori de PrEP informal” au declarat că iau acest tratament fără să fie monitorizați de medic sau cu o monitorizare medicală neregulată.

Majoritatea respondenților femei au provenit din 3 țări: Germania, Elveția și Portugalia.




1 CINE A RĂSPUNS LA CHESTIONAR?




Jumătate dintre ele aveau maxim **30 de ani**.

STATUS RELAȚIONAL



SITUAȚIE FINANCIARĂ



ACTIVITATEA SEXUALĂ DIN ULTIMELE 6 LUNI

SEX CU

NICIUN PARTENER
SEXUAL

23%

158



64%

440



6%

41



<1%

1



5%

36



<1%

3



<1%

1



1%

7



2 CUNOȘTIȚE ȘI ATITUDINI DESPRE PREP

47%

au afirmat că știau ce este PrEP încă dinainte să participe la cercetare.

Dintre acestea,

74%

aveau informații corecte despre PrEP. În rândul respondenților care dețineau informații greșite, cel mai frecvent întâlnită a fost confuzia dintre PEP și PrEP.

18%

s-au arătat interesate să utilizeze PrEP. Principalele motive:

- „M-aș simți mai în siguranță”
- și
- „Aș fi mai puțin îngrijorată”

Principalele motive ale celor care NU erau interesate:

- „Nu am nevoie să schimb modul în care mă protejez”
- și
- „Nu cred că sunt la risc să mă infectez cu HIV”

29%

au fost de părere că PrEP le va acoperi nevoile în materie de prevenire.

3 PREFERINȚE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CONDIȚIILE DE DISTRIBUIRE

84%

au fost de părere că PrEP trebuie distribuită ca parte dintr-un pachet complex de prevenire (testare regulată pentru HIV și IST-uri, tratament, sprijin din partea altor persoane peer etc.).

- Centrele de sănătate comunitare
- și
- Cabinetele medicilor generaliști

au fost considerate cele mai potrivite locuri pentru distribuția PrEP pe viitor.

60%

dintre respondente ar dori ca PrEP să fie gratuită pentru cei care au nevoie de ea

iar 29% au fost de părere că PrEP ar trebui să fie acoperită cel puțin parțial de asigurarea de sănătate.

4 UTILIZARE INFORMALĂ

Dintre respondentele care știau deja ce este PrEP dinainte să răspundă la chestionar,

1%
(n=4)

luau deja PrEP în afara unui cadru formal.

Acestea obțineau pastilele de PrEP cu

- rețetă de la medici (utilizare off label)
- rețetă de la medic spunând că sunt HIV pozitive
- de la un prieten HIV pozitiv care le dădea pastile
- sau
- alt utilizator de PrEP.

Aceste 4 “utilizatoare de PrEP informal” au declarat că nu erau monitorizate de medic pentru tratamentul cu PrEP sau că erau monitorizate neregulat.




În total, au răspuns la chestionar 245 de transgenđeri, dintre care 145 (59%) erau Bărbat-Femeie și 100 (41%) Femeie-Bărbat. Din cauza numerelor scăzute, aceste două categorii nu sunt prezentate distinct în rezultatele de mai jos.


1 CINE A RĂSPUNS LA CHESTIONAR?

← Jumătate dintre respondenți aveau cel mult **28 de ani**.

STATUS RELAȚIONAL



SITUAȚIE FINANCIARĂ



ACTIVITATEA SEXUALĂ DIN ULTIMELE 6 LUNI

SEX CU

NICIUN PARTENER
SEXUAL

37%

90

♂

36%

89

♀

6%

15

♀

2%

4

♂ + ♀

7%

17

♂ + ♀

6%

14

♀ + ♀

2%

5

♂ + ♀ + ♀

4%

11



245

2 CUNOȘTIȚE ȘI ATITUDINI DESPRE PREP

55%

au afirmat că știau ce este PrEP încă dinainte să participe la cercetare.

Dintre aceștia, aproape

75%

aveau informații corecte despre PrEP. În rândul respondenților care dețineau informații greșite, cel mai frecvent întâlnită a fost confuzia dintre PEP și PrEP.

44%

erau interesați să utilizeze PrEP. Principalele motive:

- „M-aș simți mai în siguranță”
- și
- „Aș fi mai puțin îngrijorat”

Principalele motive ale celor care NU erau interesați:

- „Sunt îngrijorat cu privire la efectele secundare”
- și
- „Nu vreau să iau medicamente în fiecare zi”

45%

au fost de părere că PrEP le va acoperi nevoile în materie de prevenire.

3

PREFERINȚE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CONDIȚIILE DE DISTRIBUIRE

84%

au fost de părere că PrEP trebuie distribuită ca parte dintr-un pachet complex de prevenire (testare regulată pentru HIV și IST-uri, tratament, sprijin din partea altor persoane peer etc.).

- Centrele de sănătate comunitare
- și
- Cabinetele medicilor generaliști

au fost considerate cele mai potrivite locuri pentru distribuția PrEP pe viitor.

64%

dintre respondenți ar dori ca PrEP să fie gratuită pentru cei care au nevoie de ea

iar

25%

au afirmat că PrEP trebuie acoperită cel puțin parțial de asigurarea de sănătate.

4

UTILIZARE INFORMALĂ

Dintre respondenții care știau ce este PrEP dinainte de a răspunde la chestionar,

4%
(n=5)

luau deja PrEP în afara unui cadru formal.

Aceștia își obțineau tabletele PrEP

- de la un prieten HIV pozitiv,
- le cumpărau online,
- cumpărau generice din alte țări
- sau
- de la participanți în studii clinice PrEP.

3

dintre acești „utilizatori de PrEP informal” au declarat că nu sunt monitorizați de medic pentru PrEP sau că sunt monitorizați neregulat.

CONCLUZIE

Profilele respondenților au variat foarte mult, în funcție de metoda de recrutare. Acest fapt a avut o influență puternică asupra rezultatelor cercetării.

Nivelul de informare a fost puternic influențat de profilele respondenților, situându-se între 37% și 77%. Dintre participanții care știau ce este PrEP dinainte să răspundă la chestionar, **majoritatea aveau informații corecte despre PrEP.**

Interesul față de PrEP a fost relativ crescut în rândul respondenților, deși mai scăzut la femei.

Se pare că **PrEP ar răspunde nevoilor de prevenire** pentru un număr mare de respondenți.

Majoritatea au fost de părere că **PrEP ar trebui distribuită în cadrul unui pachet complex de prevenire** (care să includă și sprijin din partea persoanelor peer).

O majoritate importantă de respondenți au fost de părere că **PrEP ar trebui să fie gratuită sau, cel puțin, parțial acoperită de asigurarea de sănătate.**

Majoritatea respondenților ar dori ca **PrEP să fie distribuită în locații comunitare: centre de sănătate comunitare sau cabinetele medicilor generalişti.**

Un număr non-neglijabil de respondenți iau deja PrEP informal, cel mai frecvent fără o monitorizare medicală adecvată.

